

# Forårssået vinterrug til afgræsning

efter kløvergræs



## Etablering

- Såning fra marts/april i bekvem jord
- Rug 200 planter/m<sup>2</sup> (ca. 100 kg/ha)
- 20 kg diploid Ital. Rajgræs
- Eller 30 kg tetraploid Ital. Rajgræs
- Test spireprocenten på rug forår!!!

## Afgræsning

- Afgræs første gang når rugen er 10 – 15 cm høj (6-8 sideskud)
- Afgræs herefter med max 5 dages mellemrum
- Tæt afgræsning holder rugbladene friske uden svampeangreb
- Ædelysten forringes stærkt ved svampeangreb
- Afpuddning af vraggræs hindrer stængeldannelse



ØkologiRådgivning  
Danmark ApS

# Dyrkningsvejledning

## Forårssået vinterrug til afgræsning

- Forårssået vinterrug m I.R er en ideel enårig ”sædskiftegræs” tæt på stalden.
- Forårssået vinterrug er klar til afgræsning efter 4-6 uger efter såning.
- Forårssået vinterrug har vegetativ bladvækst.
- Afgræsning af letfordøjelig bladvækst supplerer kløvergræs godt til afgræsning i juni-juli måned.
- Forårssået rug med italiensk rajgræs er effektiv til at opsamle kvælstof efter nedpløjet kløvergræs.
- Et tæt rugdække (mindst 200 pl/m<sup>2</sup>) mindsker ukrudt og giver mindre optrædning.
- Hyppig og tæt afgræsning sikrer friske skud fri for meldug og rustsvampe.
- Hen på sommeren sker sporadisk stængeldannelse i vraggræs. Afpuds vraggræs.
- Rug sået i juni kan angribes hårdt af 2. generation fritfluer.
- Erfaringsmæssigt kan rugen tabe væsentlig spireevne i løbet af vinteren. Så test spireevne om foråret!!

### Rugudsæd- mindst 200 pl/m<sup>2</sup>

Alle vinterrug sorter kan anvendes. Samme udsædsmængde anbefales uanset sort. Plantetallet betyder mest.

Med normal spireevne på godt 90 % svarer 200 pl/ m<sup>2</sup> til til udsædsmængde på ca. 100 kg/ha.

Desværre kan vinterrug have mistet betydelig spireevne i løbet af vinteren. Test spireevne og kassér såsæd med mindre end 80 % spireevne. Dårligt udsæd fremspirer ofte for ringe ved lave jordtemperaturer.

### Ital. Rajgræs

Diploide sorter udvikler et tættere og mere holdbart græsdekke ved afgræsning end tetraploide. Der anbefales en udsædsmængde for diploide sorter på 20 kg pr. ha og tetraploide 30 kg pr. ha.

### Kløvergræsudlæg

Vinterrug (ikke kløvergræsforfrugt) der bliver afgræsset tæt fungerer fint som dæksæd for kløvergæsudlæg.

### Såning

I marts-april i afdrænet, bekvem jord. Sådybde mellem 2-4 cm på en fast bund. Blandes rajgræs i rug må sådybden ikke overstige 2-3 cm. En omhyggelig pakning/tromling sikrer en god fremspiring og modvirker optrædning.

Rug/rajgræs er en fleksibel afgrøde, der kan bruges ved senere såning i tilfælde af stankelbensangreb.

### Kløvergræsforfrugt er fuldgødsning af ruggræs

Kløvergræs ompløjet forår frigiver mellem 200 – 300 kg kvælstof/ha. Det kan normalt fuldgødske en ruggræsmark.

En findeling af kløvergræsset inden nedpløjning sætter fart i kvælstofomsætningen. 15-20 ton gylle som startgødning er der god erfaring med. **Hvis forfrugten er korn kræves 25-30 tons gylle som start gødning og supplerer senere på sommeren.**

### Start afgræsning allerede medio maj ved såning 1. april

Begynd tidligt når rugen har 6-8 skud/plante eller ved en højde på 10-15 cm. Det er normalt medio maj ved såning

1.april. Rugen afgræsses med kort interval på 5 dage. Hvis rugen bliver for lang nedsættes ædelysten. Efter 10-14 dages hviletid bliver rugen ofte angrebet af meldug eller rust og køernes ædelyst mindskes. Rugen afpudses efter behov mod ukrudt og vraggræs omkring kokasser. I juli kommer der sporadisk stængeldannelse i vraggræspartier.

Rugen kan indgå i daglig afgræsning med andre græsmarker.